

FerProst®Sol è un integratore alimentare a base di estratti di **Serenoa**, **Salice** e **Boswellia** caratterizzato da una più marcata azione antinfiammatoria.

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina
Boswellia e.s.	468 mg
- acidi boswellici	351 mg
Salice e.s.	320 mg
- salicina	96 mg
Serenoa e.s.	320 mg



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno da sciogliere in 200 ml (un bicchiere) di acqua:

- Nel trattamento delle patologie prostatiche benigne
- Nel trattamento delle prostatiti, da solo o in associazione alla terapia antibiotica



**14 bustine
POLVERE SOLUBILE**

Una forma di somministrazione solubile in acqua per il trattamento di:

- Ipertrofia Prostatica Benigna e sintomi irritativi-ostruttivi del distretto genitourinario
- Prostatiti da solo o in associazione alla terapia antibiotica
- Traumatismi del distretto uro-genitale e/o decorso post-operatorio

Boswellia

L'estratto di Boswellia serrata contenuto nel prodotto è titolato in acidi boswellici (75%). Tale estratto ha dimostrato un effetto farmacologico legato prevalentemente alla soppressione di leukotrieni dovuta alla inibizione della 5-lipossigenasi. La sua attività anti-infiammatoria è stata confermata da numerosi studi clinici.

Serenoa R.

Pianta medicinale di cui si utilizzano frutti essiccati. Ha effetto antiandrogeno periferico, per interazione sul metabolismo del testosterone a livello prostatico, ed un effetto inibitorio su lipossigenasi e ciclossigenasi con conseguente azione antiinfiammatoria. In particolare, inibisce il legame del diidrotestosterone ai recettori degli androgeni e, allo stesso tempo, è in grado di inibire anche l'attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi (tipo 1 e tipo 2), responsabile della trasformazione del testosterone in diidrotestosterone, metabolita attivo responsabile dello stimolo sulla proliferazione cellulare tipica dell'ipertrofia prostatica.

Salicina

Deriva dalla corteccia dei rami del salice. Possiede proprietà analgesiche, antinfiammatorie antipiretiche ed antireumatiche.

Avvertenze:

Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Se si stanno assumendo farmaci antiaggreganti o anticoagulanti si consiglia di sentire il parere del medico. Si sconsiglia l'uso per bambini e adolescenti.



Senza glutine