



Linea **GINECOLOGICA**

il benessere della donna
in **ogni fase della vita**

NeoClimagen®

Una formula completa con estratti vegetali di efficacia comprovata per contrastare i sintomi della **Menopausa**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 compresse	% VNR*
Salvia e.s.	700 mg	---
Passiflora e.s. di cui flavonoidi (vitexina)	200 mg 8 mg	---
Luppolo e.s.	200 mg	---
Trifoglio e.s. di cui isoflavoni	100 mg 20 mg	---
Soia e.s. di cui genisteina	100 mg 40 mg	---
Cimicifuga e.s. di cui triterpeni glicosidici	80 mg 2 mg	---
Vitamina D	50 µg	1000%
Zinco	10 mg	100%



Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno, da deglutire intere con un bicchiere d'acqua.



30 compresse

NeoClimagen® per contrastare la sintomatologia della Menopausa
a **breve termine:**

Salvia
700 mg



Luppolo
200 mg

contrastano i sintomi
vasomotori:
Vampate di calore
Sudorazione

Trifoglio
Rosso
100 mg



Cimicifuga
80 mg



Soia
100 mg

Migliorano l'**equilibrio ormonale:**
Riducono i livelli ematici di **LH** e **FSH**
Contrastano l'**atrofia vaginale**

e a **lungo termine:**

Vit. D
2000 UI

Previene la perdita
di massa ossea

Passiflora

Contrasta
stati d'ansia

Soia
&
Zinco

Migliorano il profilo
lipidico

Bibliografia

- 1) Zeidabadi A. Et al, The effect of Salvia officinalis extract on symptoms of flushing, night sweat, sleep disorders, and score of forgetfulness in postmenopausal women, J Family Med Prim Care. 2020 Feb 28;9(2):1086-1092
- 2) Castelo-Branco C. Et al, Review & meta-analysis: isopropanolic black cohosh extract (CR) for menopausal symptoms - an update on the evidence. Climateric. 2021; VOL 24, NO. 2, 109-119
- 3) Effectiveness of red clover in alleviating menopausal symptoms: a 12-week randomized, controlled trial. F. Shakeri et al. Climateric vol. 18, 2015 Pages 568-573
- 4) Aghamiri V. Et al, The effect of Hop (Humulus lupulus L.) on early menopausal symptoms and hot flashes: A randomized placebo-controlled trial. Complement Ther Clin Pract. 2016 May;23:130-5.
- 5) Vázquez-Lorente H. Et al, Effect of zinc supplementation on circulating concentrations of homocysteine, vitamin B12, and folate in a postmenopausal population. J Trace Elem Med Biol. 2022 May;71:126942.

FertylOrF®

Una nuova opportunità per contrastare l'**infertilità idiopatica** e da **Sindrome dell'Ovaio Policistico (PCOS)**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata


Ingrediente	Per 1 bustina	Per 2 bustine	%VNR
Inositolo (mio-inositolo)	2 g	4 g	---
L-Carnitina	350 mg	700 mg	---
Coenzima Q10	80 mg	160 mg	---
Vitamina E	15 mg	30 mg	250%
Acido Folico	200 mcg	400 mcg	200%
Vitamina B12	25 mcg	50 mcg	2000%



20 bustine

Si consiglia l'assunzione di 1-2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.

Una formula per contrastare lo **stato infiammatorio** e lo **stress ossidativo** provocati dalla PCOS che compromette la qualità ovocitaria e le alterazioni metaboliche legate alla insulino-resistenza



FertylOrF®, grazie all'associazione sinergica di Mio-inositolo, L-Carnitina, Acido Folico e antiossidanti, **aiuta a ridurre i livelli di stress ossidativo, aumenta la qualità degli ovociti, migliorando così la fertilità**

Bibliografia

- 1) Liu et al, Global, regional, and national burden of infertility attributable to PCOS, 1990–2019, Human Reproduction, Volume 39, Issue 1, January 2024, Pages 108–118
- 2) Vitagliano, Garolla et al, Dietary Supplements for Female Infertility: A Critical Review of Their Composition, Nutrients 2021, 13, 3552
- 3) Kitano Y, et al, Oral administration of L-carnitine improves the clinical outcome of fertility in patients with IVF treatment, Gynecological Endocrinology, 2018 DOI: 10.1080/09513590.2018.1431769
- 4) Florou P, Anagnostis P, Theocharis P, Chourdakis M, Goulis DG. Does coenzyme Q10 supplementation improve fertility outcomes in women undergoing assisted reproductive technology procedures? A systematic review and meta-analysis of randomized-controlled trials. J Assist Reprod Genet. 2020 Oct;37(10):2377–2387. doi: 10.1007/s10815-020-01906-3.
- 5) Santanam N, Kavtaradze N, Murphy A, Dominguez C, Parthasarathy S. Antioxidant supplementation reduces endometriosis related pelvic pain in humans. Transl Res. 2013;161:189–95.

NeoDismen®

L'Integratore naturale per combattere la sintomatologia della **Sindrome premestruale** e della **Dismenorrea** ed affrontare serenamente i giorni del ciclo

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 compresse	%VNR
Agnocasto e.s. di cui agnuside	300 mg 1,5 mg	---
Zenzero e.s. di cui gingeroli e shogaoli	300 mg 30 mg	---
Camomilla e.s.	250 mg	---
Pilosella e.s. di cui flavonoidi totali	150 mg 1,5 mg	---
Vitamina E	60 mg	500%
Vitamina B6	6 mg	429%
Magnesio	150 mg	40%



Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno, da deglutire intere con un bicchiere d'acqua.

30 compresse



**Agnocasto
300 mg**

Attività agonista
dopaminergica

Tensione mammaria

Gonfiore addominale

Sbalzi umorali

Irritabilità

**Zenzero
300 mg**

Azione antinfiammatoria
e analgesica

Dolore Mammario

Dolore Pelvico

Dolori Lombari

Emicrania/Nausea

**Camomilla
Vitamina B6**

Supporto
della sfera emotiva

Irritabilità

Stanchezza mentale

Insomnia

Aumento appetito

Magnesio

Contrasto dei sintomi

Stanchezza

Affaticamento

Contrattilità utero

Irritabilità

NeoDismen®: una formula naturale completa ed efficace per contrastare a 360° i sintomi di SPM e Dismenorrea

Bibliografia

- Verkaik S. et al, The treatment of premenstrual syndrome with preparations of Vitex agnus castus: a systematic review and meta-analysis, Am J Obstet Gynecol, 2017; 217(2):150-166.
- Khaat S. et al, Ginger impact on the symptoms of premenstrual syndrome in female students with PMS, Medsurg Nurs, 2014;3:10-16.
- Boyle N.B. et al, The effects of magnesium supplementation on subjective anxiety Magnes Res 2016 Mar 1, 29(3), 120-125
- Sharifi F. et al, Comparison of the effects of matricaria chamomila (chamomile) extract and mefenamic acid on the intensity of premenstrual syndrome. Complement TherClin Pract 2014, Feb;20(1):81-8.
- Wyatt KM. et al, Efficacy of vitamin B6 in the treatment of premenstrual syndrome: systematic review, BMJ. 1999 May 22; 318(7195): 1375-1381
- Willer et al, Ethnopharmacology, phytochemistry, and bioactivities of Hieracium L. and Pilosella Hill (Cichorieae, Asteraceae) species, Journal of Ethnopharmacology 281 (2021)
- Duvan Cl. et al, Oxidant/antioxidant status in PMS Arch Gynecol Obstet 2011 283-299-304

Prontogral500[®]

Integratore completo per **gravidanza e allattamento**
con una formula nuova e innovativa
con il dosaggio più elevato di **DHA**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 capsula	%VNR
DHA	500 mg	---
Beta-carotene	3 mg	---
Acido folico (5-MTHF)	400 mcg	200
Vitamina B6	1,9 mg	136
Riboflavina (Vitamina B2)	1,7 mg	121
Vitamina D	20 mcg	400
Vitamina B12	10 mcg	400
Ferro	27 mg	193
Zinco	5 mg	50
Iodio	200 mcg	133



Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno da assumere con un po' d'acqua.



30 capsule molli

In una sola capsula in monosomministrazione tutti gli ingredienti essenziali nei dosaggi raccomandati dai LARN

5-MTHF

Forma attiva dell'acido folico
fondamentale per:

Ridurre il rischio di difetti del
tubo neurale nel feto

Particolarmente importante per
le donne con mutazione genetica
dell'enzima MTHF riduttasi.

**DHA
500 mg**

Favorisce lo sviluppo cerebrale e
gli occhi del feto e del lattante

Riduce il rischio di parto pretermine

IODIO

Contrasta il rischio di:

Ipotiroidismo neonatale

Aborto
Mortalità prenatale

Disturbi del neurosviluppo

• del 42 % entro la 34[°] settimana • del 11% entro la 37[°] settimana

Review Cochrane (1): 70 studi clinici in 19.927 donne in gravidanza.

Prontogral500[®] contiene i nutrienti fondamentali per la futura
mamma: **dalla fase pre-concezionale all'allattamento**

Bibliografia

1) Cochrane Database Syst Rev. 2018 Nov 15. Omega-3 fatty acid addition during pregnancy. Philippa Middleton, Judith C Gomersall, Jacqueline F Gould, Emily Shepherd, Sjurður F Olsen, Maria Makrides
2) Ferrazzi E., Giulia Tiso, Daniela Di Martino - Folic acid versus 5 - methyl tetrahydrofolate supplementation in pregnancy. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 253 (2020) 312-319
3) Linee guida Nutrizione in gravidanza e Allattamento, Fondazione Confalonieri Ragonesi su mandato SIGO-AOGOI-AGUI, giugno 2018 - Iodio pag 33-34

Cis400®

Il **controllo della cistite** inizia da quello della flora intestinale

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	%VNR
D-Mannosio	1000 mg	---
Cranberry e.s. - proantocianidine (PAC)	100 mg 40 mg	---
Pompelmo e.s.	150 mg	---
Fermenti lattici: Bacillus coagulans (BC513)	1 mld UFC*	---
Vitamina C	90 mg	112,5
Zinco	12,5 mg	125
Selenio	55 mcg	100




> Nella prevenzione delle cistiti recidivanti:
1 bustina al giorno* per 14 giorni,
ogni 2-3 mesi

> Nella fase acuta, a supporto della terapia
con antibiotici o disinfettanti urinari:
1 bustina al giorno* per 14-28 giorni

14 bustine

In fase acuta come supporto ad antibiotici/disinfettanti urinari e nella
prevenzione delle cistiti recidivanti croniche.

Si distingue per la varietà e la sinergia dei meccanismi d'azione degli ingredienti, il loro dosaggio e la presenza del probiotico



CIS400® è la proposta naturale più completa per il benessere delle vie urinarie, grazie alla varietà di **nutrienti con meccanismi d'azione sinergici e complementari**

Bibliografia

- 1) Altern Med Rev. 2012 Mar;17(1):76-81. Bacillus coagulans: Monograph. Jurenka JS.
- 2) Sobota - Inhibition of bacterial adherence by cranberry juice: potential use for the treatment of urinary tract infections. J. Urol. 1984
- 3) Howell - Inhibition of the adherence of P-fimbriated Escherichia coli to uroepithelial-cell surfaces by proanthocyanadin extract from cranberries. The NEJM, 1998
- 4) Heggers et al.- The Effectiveness of Processed Grapefruit-Seed Extract as An Antibacterial Agent: II. Mechanism of Action and In Vitro Toxicity - The Journal of Alternative and Complementary Medicine. July 2004
- 5) VITAMINA C. Mini Rev Med Chem. 2014 May;14(5):444-52. Ascorbic acid: its role in immune system and chronic inflammation diseases. Sorice A, Guerriero E, Capone F, Colonna G, Castello G, Costantini S.

FerDol®

La formula per il **trattamento degli stati flogistico-edematosi**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata


Ingrediente	Per 2 compresse
Boswellia e.s.	668 mg
- acidi boswellici	434 mg
Bromelina	400 mg
Ippocastano e.s.	340 mg
- escina	68 mg
Meliloto e.s.	147 mg
- cumarina	25 mg



20 compresse

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno (una al mattino e una alla sera).
Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.

Sinergia tra attività antinfiammatoria (**boswellia** e **bromelina**) ed antiedemigena (**ippocastano** e **meliloto**)



Annessite

Mastodina

Flogosi urogenitale

Dolore pelvico

Problemi circolatori arti inferiori

Alis® Detergente


Alis® Detergente pH4,5 per soddisfare la necessità di una corretta igiene intima

Applicare sulle parti intime un'adeguata quantità di prodotto (effettuare un delicato massaggio e risciacquare).

pH: 4,5

Dermatologicamente e clinicamente testato

Flacone da 250 ml



ALIS® Detergente pH4,5 è adatto per l'igiene intima femminile quotidiana, anche in gravidanza e nel post partum; non interferisce con terapie o trattamenti locali

Linea **GINECOLOGICA**



Salvia
700 mg

Luppolo
200 mg

Trifoglio
Rosso
100 mg

Cimicifuga
80 mg

Soia
100 mg

Passiflora

Soia
&
Zinco

Vit. D
2000 UI

Una formula completa per
contrastare i sintomi della
Menopausa

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno,
da deglutire intere con un bicchiere d'acqua

30 compresse



Mio-Inositolo
4g

L-Carnitina

Coenzima
Q10
Vitamina E

Acido Folico
&
Vit. B12

2 bustine da 2g

Si consiglia l'assunzione di 1-2 bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml
(un bicchiere) d'acqua.

20 bustine



Nuovo approccio nel trattamento della **sindrome premestruale**
e della **dismenorrea**

Agnocasto
300 mg

Zenzero
300 mg

Camomilla
Vitamina B6

Magnesio

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno,
prima e durante il ciclo, da deglutire intere con un
bicchiere d'acqua

30 compresse



Integratore alimentare con il dosaggio più elevato di **DHA: 500 mg**

DHA
500 mg

5-MTHF

IODIO

Vitamine e
minerali

Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno da
assumere con un po' d'acqua.

30 capsule molli



Per il **controllo della cistite**

D-Mannosio
Cranberry

Semi di
pompelmo

Bacillus
Coagulans

Vit. C
Zinco
Selenio

Nella prevenzione delle cistiti recidivanti: 1 bustina
al giorno* per 14 giorni, ogni 2-3 mesi

Nella fase acuta, a supporto della terapia con
antibiotici o disinfettanti urinari:
1 bustina al giorno* per 14-28 giorni

14 bustine



Per il trattamento degli stati **flogistico-edematosi**

Boswellia

Bromelina

Ippocastano

Meliloto

Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno
(una al mattino e una alla sera).
Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.

20 compresse



Detergente Intimo a pH4,5 con **estratti fitoterapici** per una
corretta igiene intima

Acido
lattico

Semi di
pompelmo

Olio ess.
di salvia

Olio di
melaleuca

Vitamina E

Applicare sulle parti intime un'adeguata
quantità di prodotto (effettuare un
delicato massaggio e risciacquare).

Flacone da 250 ml