



Linea **UROLOGICA**

il benessere dell'apparato
urogenitale maschile, **ogni giorno**

ReneClin®

Un nuova associazione di fitoestratti e citrati per una scelta efficace nella **calcolosi renale**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	Per 2 bustine
Cumino nero e.s.	500 mg	1000 mg
Cedracca e.s.	500 mg	1000 mg
Fillanto e.s.	250 mg	500 mg
Citrato di magnesio	909 mg	1.818 mg
- Magnesio	100 mg (VNR = 27%)	200 mg (VNR = 53%)
Citrato di potassio	833 mg	1.666 mg
- Potassio	300 mg (VNR = 15%)	600 mg (VNR = 30%)
Vitamina B6	5 mg (VNR = 357%)	10 mg (VNR = 714%)



20 bustine


Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 bustine al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in 100 ml d'acqua.



Favoriscono la dissoluzione dei microcristalli di **ossalato di calcio** e **acido urico**.

Riducono la dimensione dei calcoli.

Aumentano la solubilità dei sali alcalini e rilassano la muscolatura liscia per favorire l'**espulsione dei calcoli**.



Aumentano il pH urinario favorendo la dissoluzione dei calcoli e riducendo il rischio di sovrassaturazione dei sali.

Inibiscono la cristallizzazione e l'aggregazione di nuovi sali.

Riducono l'escrezione urinaria di ossalati di Potassio.

Una carenza di Vit. B6 aumenta la quantità di acido ossalico nelle urine.

Benefici di ReneClin:

- ✓ **Espulsione** dei calcoli di piccole dimensioni
- ✓ **Eliminazione** dei frammenti residui **post-litotrissia**
- ✓ **Prevenzione** della calcolosi nei **soggetti a rischio** (familiarità, dieta, stile di vita, recidive)

Bibliografia

- 1) Ardakani MRM, et al, Efficacy of black seed [Nigella Sativa L.] on kidney stone dissolution: A randomized, double-blind, placebo-controlled, clinical trial, Phytotherapy Research, 2019
- 2) Pucci N, et al, Effect of phyllanthus niruri on metabolic parameters of patients with kidney stone: a perspective for diseaseprevention, Int Braz J Urol Jul-Aug;44(4):758-764, 2018
- 3) De Bellis R, et al, In vitro effects on calcium oxalate crystallization kinetics and crystal morphology of an aqueous extract from Ceterach officinarum: Analysis of a potential antilithatic mechanism. PLoS One Jun 25;14(6), 2019
- 4) Zeng H, et al, Multivitamins co-intake can reduce the prevalence of kidney stones: a large-scale cross-sectional study. Int Urol Nephrol. Sep;56(9):29991-30001, 2024

FerProst[®]Sol

Una nuova forma di somministrazione
solubile in acqua per il trattamento di:

Ipertrofia Prostatica Benigna
e sintomi irritativi-ostruttivi del
distretto genitourinario

prostatiti
da solo o in associazione
alla terapia antibiotica

**traumatismi del distretto
uro-genitale** e/o decorso
post-operatorio

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina
Boswellia e.s.	468 mg
- acidi boswellici	351 mg
Salice e.s.	320 mg
- salicina	96 mg
Serenoa e.s.	320 mg

Si consiglia l'assunzione di **1 bustina al giorno da sciogliere in 200 ml** (un bicchiere) di acqua:

- Nel trattamento delle patologie prostatiche benigne
- Nel trattamento delle prostatiti, da solo o in associazione alla terapia antibiotica



14 bustine
POLVERE SOLUBILE

Ferprost[®]Sol è un integratore alimentare con una nuova forma di somministrazione caratterizzata da una più marcata azione antinfiammatoria a base di estratti di **Serenoa, Salice e Boswellia**.

Boswellia

Azione antimicrobica
Proprietà antinfiammatorie

Salicina

Proprietà analgesiche
Proprietà antinfiammatorie

Serenoa R.

Azione antiandrogena
Proprietà antinfiammatorie

Nuova forma di somministrazione
caratterizzata da una più marcata
azione antinfiammatoria

Bibliografia

1. Almeida-da-Silva et al, Effects of Frankincense Compounds on Infection, Inflammation, and Oral Health, Molecules, 2022
2. Siddiqui M.Z., Boswellia serrata, a potential antiinflammatory agent: an overview, Indian J Pharm Sci, 2011
3. Rev Urol. 2008 Summer; 10(3): 192-206. Nutraceuticals in Prostate Disease: The Urologist's Role. J Curtis Nickel, MD, FRCSC,* Daniel Shoskes, MD, MSc, FRCS(C),† Claus G Roehrborn, MD, FACS,‡ and Mark Moyad, MPH

FerProst[®] Forte

Il modo più completo ed efficace per affrontare le affezioni complesse o recidivanti della prostata

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 capsula	%VNR
Serenoa e.s.	320 mg	---
Quercetina	200 mg	---
Rutina	100 mg	---
Pomodoro e.s.	22,2 mg	---
- Licopene	4 mg	---
Vitamina E	20 mg	167
Zinco	7,5 mg	75

Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno per 1 o più mesi. Deglutire la capsula con un sorso d'acqua senza masticarla.



Ferprost[®] Forte è un integratore alimentare a base di **Serenoa** (85-95% acidi grassi totali), **Licopene**, **Quercetina**, **Rutina** con aggiunta di **Zinco** e **Vitamina E**.



Azione antiandrogena
Proprietà antinfiammatorie



Effetto antiossidante



Potere antiossidante
Proprietà antinfiammatorie

Associazione efficace di sostanze naturali con attività sinergica per contrastare i sintomi dell'**Iperplasia Prostatica Benigna**

FerProstK®

Fattori di rischio che aumentano la probabilità di sviluppare
K PROSTATICO



Familiarità



Età



PSA instabile



Stile di vita scorretto



Obesità/sovrappeso

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina
Tè verde e.s.	300 mg
- catechine	225 mg
- EGCG	135 mg
Luppolo e.s.	100 mg
- flavonoidi	5 mg
Pomodoro e.s.	100 mg
- licopene	5 mg
Melograno e.s.	100 mg
- acido ellagico	40 mg
Goji e.s.	100 mg
- polisaccaridi	40 mg
Resveratrolo	50 mg



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml
(un bicchiere) d'acqua.

30 bustine

La formula di **FerprostK®** contiene nutrienti che hanno azione sinergica.

ATTIVITÀ
CHEMIO-PREVENTIVA

CONTRASTO
STRESS OSSIDATIVO

SOSTEGNO
DEL SISTEMA
IMMUNITARIO

ATTIVITÀ
ANTIANDROGENA

RIDUZIONE DEGLI
EFFETTI COLLATERALI DA
RADIO/CHEMIOTERAPIA

Melograno

Tè Verde

Luppolo

Licopene

Bacche di Goji

Resveratrolo

Un'associazione innovativa di fitoterapici utile
nella **prevenzione e nel trattamento di**
carcinoma prostatico nei soggetti a rischio

Fertylor[®]Plus

Una formula per contrastare in modo naturale l'**infertilità maschile**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 capsula	%VNR
L-Arginina	1000 mg	---
L-carnitina	500 mg	---
Maca e.s.	500 mg	---
Coenzima Q10	150 mg	---
<i>Haematococcus pluvialis</i> e.s.	80 mg	---
- Astaxantina	8 mg	---
Vitamina C	500 mg	625%
Vitamina E	30 mg	250%
Zinco	15 mg	150%
Acido folico	400 mcg	200%
Selenio	100 mcg	182%
Vitamina B12	25 mcg	1000%



20 bustine

Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml
(un bicchiere) d'acqua.

Gli ingredienti contenuti in **Fertylor[®]Plus** agiscono su 3 fattori **complementari** e **sinergici** tra loro:

Incremento
metabolismo energetico
dello spermatozoo

Maca
L-carnitina

Per promuovere e
migliorare la motilità

Contrasto
stress ossidativo

Coenzima Q10
Astaxantina
Vit. C, E
Zn, Se

Per migliorare la
funzionalità dello
spermatozoo

Meccanismi che
favoriscono la
capacitazione

Astaxantina

Per favorire l'induzione
della reazione
acrosomiale

PeyroCur® Forte

Una formula a doppia azione con ingredienti ad attività sinergica antifibrotica e antiossidante per il trattamento della fase iniziale della **Malattia di la Peyronie**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	% VNR
L-carnitina	500 mg	---
Vitamina C	500 mg	625%
Salvia cinese e.s.	300 mg	---
L-Arginina	200 mg	---
Coenzima Q10	160 mg	---
Vitamina E	60 mg	500%
Zinco	15 mg	150%
PABA	100 mg	---
<i>Haematococcus pluvialis</i> e.s.	80 mg	---
- Astaxantina	8 mg	---
Acido folico	400 mcg	200%
Selenio	100 mcg	182%



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.



14 bustine

ATTIVITÀ ANTIFIBROTICA



L-CARNITINA: 500 mg

ARGININA: 200 mg



L'integrazione con **Peyrocur® Forte** contrasta la **formazione della placca** grazie all'azione sinergica di nuovi ingredienti

ATTIVITÀ ANTIOSSIDANTE



COENZIMA Q10: 160 mg

ASTAXANTINA

VITAMINA C: 500 mg

VITAMINA E & SELENIO



L'integrazione con antiossidanti migliora la sintomatologia nella fase iniziale caratterizzata da uno **stato infiammatorio**

Cis400®

Il **controllo della cistite** inizia da quello della flora intestinale

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	%VNR
D-Mannosio	1000 mg	---
Cranberry e.s. - proantocianidine (PAC)	100 mg 40 mg	---
Pompelmo e.s.	150 mg	---
Fermenti lattici: Bacillus coagulans [BC513]	1 mld UFC*	---
Vitamina C	90 mg	112,5
Zinco	12,5 mg	125
Selenio	55 mcg	100



> Nella prevenzione delle cistiti recidivanti:
1 bustina al giorno* per 14 giorni,
ogni 2-3 mesi


> Nella fase acuta, a supporto della terapia
con antibiotici o disinfettanti urinari:
1 bustina al giorno* per 14-28 giorni

14 bustine

*Assumere alla sera prima di coricarsi e a vescica vuota

In fase acuta come supporto ad antibiotici/disinfettanti urinari e nella
prevenzione delle cistiti recidivanti croniche.

Si distingue per la varietà e la sinergia dei meccanismi d'azione degli ingredienti, il loro dosaggio e la presenza del probiotico



CIS400® è la proposta naturale più completa per il benessere delle vie urinarie, grazie alla varietà di **nutrienti con meccanismi d'azione sinergici e complementari**

FerDol®

La formula per il **trattamento degli stati flogistico-edematosi**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata


Ingrediente	Per 2 compresse
Boswellia e.s. - acidi boswellici	668 mg 434 mg
Bromelina	400 mg
Ippocastano e.s. - escina	340 mg 68 mg
Meliloto e.s. - cumarina	147 mg 25 mg

➤ Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno (una al mattino e una alla sera).
Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.

20 compresse



Sinergia tra attività antinfiammatoria (**boswellia** e **bromelina**) ed antiedemigena (**ippocastano** e **meliloto**)



Calcolosi dell'uretere

Uretriti

Emorroidi

Varicocele

Problemi circolatori arti inferiori

BalanCur®

Gel topico per i problemi dell'area intima maschile

Azione lenitiva e riepitelizzante utile nelle balaniti e nelle balanopostiti.



➤ Prodotto ad uso topico dedicato all'area intima maschile. Si consigliano 3/4 applicazioni al giorno. Distribuire il gel sulla parte interessata e massaggiare fino al completo assorbimento.

Tubo da 30 ml

Linea UROLOGICA



20 bustine

Associazione di fitoestratti e citrati per una scelta efficace nella calcolosi renale



Cumino
Nero



Cedracca



Fillanto



Citrato di
Magnesio



Vitamina B6



Citrato di
Potassio



Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 bustina al giorno.
Sciogliere il contenuto della bustina in 100 ml d'acqua.



14 bustine
POLVERE SOLUBILE

Polvere solubile in acqua, con marcata azione antinfiammatoria nella IPB e nelle prostatiti



Boswellia



Salicina



Serenoa R.



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno da sciogliere in 200 ml (un bicchiere) di acqua:

- Nel trattamento delle patologie prostatiche benigne
- Nel trattamento delle prostatiti, da solo o in associazione alla terapia antibiotica



15 capsule

Associazione naturale e sinergica per contrastare i sintomi dell'IPB



Serenoa R.



Licopene



Quercetina
& Rutina



Si consiglia l'assunzione di 1 capsula al giorno per 1 o più mesi. Deglutire la capsula con un sorso d'acqua senza masticarla.



30 bustine

Associazione di fitoterapici utile nella prevenzione e nel trattamento di carcinoma prostatico



Tè verde



Licopene



Melograno



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.



20 bustine

Una formula per contrastare in modo naturale l'infertilità maschile



Astaxantina



Maca



L-carnitina



Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.

Prodotti per la **salute** e il **benessere** della persona



14 bustine

Una doppia azione per il trattamento della Malattia di la Peyronie

L-carnitina

Arginina

Coenzima
Q10

Astaxantina

➤ Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.



14 bustine

Per il controllo della cistite

D-Mannosio
Cranberry

Semi di
pompelmo

Bacillus Co-
agualns

Vit. C
Zinco
Selenio

➤ Nella prevenzione delle cistiti recidivanti: 1 bustina al giorno* per 14 giorni, ogni 2-3 mesi

➤ Nella fase acuta, a supporto della terapia con antibiotici o disinfettanti urinari: 1 bustina al giorno* per 14-28 giorni



20 compresse

Per il trattamento degli stati flogistico-edematosi

Boswellia

Bromelina

Ippocastano

Meliloto

➤ Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno (una al mattino e una alla sera). Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.



Tubo da 30 ml

Gel topico per i problemi dell'area intima maschile

➤ Prodotto ad uso topico dedicato all'area intima maschile. Si consigliano 3/4 applicazioni al giorno. Distribuire il gel sulla parte interessata e massaggiare fino al completo assorbimento.



Risorse esclusive e approfondimenti

Inquadra il **QR-code** qui a lato per accedere a contenuti riservati: **schede tecniche** e **materiali di approfondimento** destinati esclusivamente a **Medici** e **Farmacisti**.



Linea UROLOGICA

ReneClin®	20 bustine <i>1 o 2 bustine/die</i>	 8 050148 750284
FerProst® Sol	14 bustine <i>1 bustina/die</i>	 8 050148 750253
FerProst® Forte	15 capsule <i>1 capsula/die</i>	 A 934510381
FerProstK®	30 bustine <i>1 bustina/die</i>	 8 050148 750208
Fertyl® Plus	20 bustine <i>1 bustina/die</i>	 8 050148 750215
PeyroCur® Forte	14 bustine <i>1 bustina/die</i>	 8 050148 750239
Cis400®	14 bustine <i>1 bustina/die</i>	 8 050148 750048
FerDol®	20 compresse <i>2 compresse/die</i>	 8 050148 750185
BalanCur®	Tubo 30ml	 9 39070874

Materiale informativo destinato esclusivamente ad operatori sanitari

L.U. 09.25