

PeyroCur[®] *Forte*

Nella malattia di **La Peyronie**

**Una nuova formula
a doppia azione
antifibrotica e antiossidante**

PeyroCur[®] Forte

L'infiammazione all'interno del pene provoca la formazione di tessuto cicatriziale

L'integrazione con Peyrocur Forte contrasta la formazione della placca grazie all'azione sinergica di nuovi ingredienti

L-carnitina 500 mg:

previene la proliferazione dei fibroblasti e la collagenogenesi.



Miglioramento del dolore e dell'angolo di curvatura. ⁽¹⁾

L-arginina 200 mg:

aumenta l'ossido nitrico nella placca e riduce il rapporto collagene/fibroblasti. ⁽²⁾




Ha attività antifibrotica.

L'attività antifibrotica è associata ad una potenziata attività antiossidante

PeyroCur® Forte

L'integrazione con antiossidanti
migliora la sintomatologia nella fase iniziale
caratterizzata da uno stato infiammatorio



Peyrocur Forte contrasta lo stress ossidativo
grazie a ingredienti antiossidanti
presenti a dosaggi significativamente elevati

PeyroCur® Forte

Una **formula rafforzata con ingredienti ad attività sinergica antifibrotica e antiossidante** per il trattamento delle fase iniziale della Malattia di la Peyronie



Peyrocur Forte è un integratore alimentare a base di sostanze funzionali: **L-carnitina, L-arginina, Coenzima Q10, Astaxantina**, con l'aggiunta di minerali e vitamine che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo (Selenio e Zinco, Vitamina C e Vitamina E), Acido Folico, che supporta la normale funzione psicologica e del sistema immunitario, ed estratto di radice di Salvia cinese con attività antiossidante.

➤ Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	% VNR*
L-carnitina	500 mg	---
Vitamina C	500 mg	625%
Salvia cinese e.s.	300 mg	---
L-Arginina	200 mg	---
Coenzima Q10	160 mg	---
Vitamina E	60 mg	500%
Zinco	15 mg	150%
PABA	100 mg	---
<i>Haematococcus pluvialis</i> e.s.	80 mg	---
- Astaxantina	8 mg	---
Acido folico	400 mcg	200%
Selenio	100 mcg	182%

Bibliografia

[1] Biagiotti G, Cavallini G. Acetyl-L-carnitine vs tamoxifen in the oral therapy of Peyronie's disease: a preliminary report. BJU Int 2001;88:63-7.

[2] Valente EG, et al. L-Arginine and phosphodiesterase (PDE) inhibitors counteract fibrosis in the Peyronie's fibrotic plaque and related fibroblast cultures. Nitric Oxide 2003; 9: 229-44.

[3] Park TY, et al. The Efficacy of Medical Treatment of Peyronie's Disease: Potassium Para-Aminobenzoate Monotherapy vs. Combination Therapy with Tamoxifen, L-Carnitine, and Phosphodiesterase Type 5 Inhibitor. World J Mens Health. 2016 Apr;34(1)

[4] Zarafonitis CJ, Horrax TM. Treatment of Peyronie's disease with potassium para-aminobenzoate (potaba). J. Urol 1959; 81:770-2.

[5] Hatzimouratidis K, Eardley I, Giuliano F, Hatzichristou D, Moncada I, Salonia A, et al; European Association of Urology. EAU guidelines on penile curvature. Eur Urol 2012; 62:543-52.

[6] Safarinejad MR. Safety and efficacy of coenzyme Q10 supplementation in early chronic Peyronie's disease: a double-blind, placebo-controlled randomized study. Int J Impot Res. 2010 Sep-Oct;22(5):298-309.