

FerDol® è un integratore alimentare di **Bromelina** ed estratti titolati di **Boswellia**, **Ippocastano** e **Meliloto**, che possiede attività antinfiammatoria e antiedemigena. Formulato in modo tale da poter essere usato in patologie o condizioni caratterizzate da un processo flogistico e uno stato edematoso.

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 compresse
Boswellia e.s.	668 mg
- acidi boswellici	434 mg
Bromelina	400 mg
Ippocastano e.s.	340 mg
- escina	68 mg
Meliloto e.s.	147 mg
- cumarina	25 mg



Si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno (una al mattino e una alla sera).
Deglutire le compresse con un sorso d'acqua.



20 compresse

20 compresse

Boswellia

L'estratto di Boswellia serrata contenuto nel prodotto è titolato al 65% in acidi boswellici. Tale estratto ha dimostrato un effetto farmacologico legato prevalentemente alla soppressione di leukotrieni dovuta alla inibizione della 5-lipossigenasi. La sua attività anti-infiammatoria è stata confermata da numerosi studi clinici.

Bromelina

Composta da enzimi proteolitici presenti nell'Ananas comosus, caratterizzati da attività proteolitiche e fibrinolitiche e anti-infiammatorie dei tessuti molli. Incrementa la produzione di prostaglandine E1 ad attività anti-infiammatoria e riduce quelle ad attività pro-infiammatoria. L'attività fibrinolitica contribuisce anche all'azione antiedemigena della Bromelina, contrastando l'accumulo di liquidi extracellulari e prevenendo il conseguente edema post-infiammatorio.

Ippocastano

Gli estratti di ippocastano sono utili nei disturbi da insufficienza venosa periferica, grazie alla presenza di escina ed esculoside. L'escina rinforza i vasi capillari e riduce la loro permeabilità, mentre l'esculoside favorisce il riassorbimento fisiologico dei liquidi in eccesso che si formano nei capillari poco elastici. Questa azione combinata porta alla riduzione di edemi e gonfiori agli arti inferiori.

Meliloto

Foglie e sommità fiorite contengono flavonoidi, che per idrolisi enzimatica rilasciano cumarine. Il cui effetto principale è quello sul drenaggio linfatico. Inoltre la pianta svolge un'azione vasoprotettiva sulle pareti delle vene ed è utile nel trattamento di edemi di natura infiammatoria o da stasi e nel trattamento sintomatico delle turbe funzionali della fragilità capillare cutanea.

Modalità d'uso:

si consiglia l'assunzione di 2 compresse al giorno con abbondante acqua. Deglutire senza masticare la compressa.



Senza glutine

Avvertenze:

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.