

MovarDol[®] Forte è un integratore naturale a base di **N-acetil-D-glucosamina (NAG)**, **Zenzero**, **Boswellia** e **Centella** a dosaggi di comprovata efficacia clinica per un approccio integrale ai problemi articolari.

Quattro principi attivi che agiscono sulle tre componenti che caratterizzano la patologia articolare: **dolore, infiammazione e degenerazione della cartilagine.**

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 2 bustine
N-acetil-D-glucosamina	1500 mg
Zenzero e.s. - gingeroli e shogaoli	750 mg 37,5 mg
Boswellia e.s. - acidi boswellici	540 mg 351 mg
Centella e.s.	100 mg



Si consiglia l'assunzione di 2 bustine al giorno.
Sciogliere la bustina in 100 ml d'acqua.
(mezzo bicchiere)



In uno specifico studio clinico nella Gonartrosi **Movardol[®] Forte** è risultato più efficace del trattamento con **Glucosamina+Condroitina**:

Nel rimodellamento della cartilagine del ginocchio

Nella riduzione della sintomatologia dolorosa

Nella riduzione del ricorso ai FANS

Belcaro G, Cesarone Mr, Feragalli B, Cotellese R, Hu S, Dugall M, et al. Manage- ment of symptoms, pain and mobility with supplementary managements (inclu- ding Movardol Forte) in osteoarthritis: a 6-month, morphology supplement study. Minerva Ortop traumatol 2020;71. doi: 10.23736/50394-3410.20.04008-4).

NAG

La N-Acetil-D-glucosamina è la forma attiva della glucosamina, necessaria per la biosintesi dell'Acido ialuronico componente naturale della cartilagine e del liquido sinoviale. Favorisce la sintesi dei glicosaminoglicani e del collagene rinforzando la matrice cartilaginea e stimola la produzione di acido ialuronico migliorando la viscosità del liquido sinoviale. Inibisce l'attività degli enzimi responsabili dell'infiammazione e della degradazione della cartilagine. Possiede numerosi vantaggi rispetto alla Glucosamina di cui il più importante è la capacità di non indurre insulino-resistenza, a differenza della Glucosamina; è quindi più sicura in pazienti diabetici o prediabetici.

Zenzero

L'estratto di Zenzero, titolato in gingeroli al 5%, risulta utile per supportare la funzionalità articolare: diversi meccanismi sono alla base degli effetti analgesici e antinfiammatori: inibisce l'enzima COX2 e la sintesi di Leucotrieni coinvolti nel processo infiammatorio e possiede una attività antagonista del recettore vanilloide TRPV1, coinvolto nel sistema di trasduzione dello stimolo doloroso dalla periferia verso l'SNC.

Boswellia

L'estratto di Boswellia serrata contenuto nel prodotto è titolato al 65% in acidi boswellici. Tale estratto favorisce la funzionalità articolare e aiuta a contrastare il dolore. L'attività antiinfiammatoria si esplica fondamentalmente attraverso due meccanismi d'azione: inibizione della 5-lipossigenasi e inibizione della migrazione leucocitaria e dell'elastasi.

Centella

L'estratto di Centella asiatica svolge un'azione antinfiammatoria, antiossidante ed antiedematosa, rinforzando il tono vascolare e riducendo la permeabilità capillare.



Senza glutine

Avvertenze:

Non superare le dosi consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni. Gli integratori non vanno intesi come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.