

PeyroCur® Forte è un integratore alimentare a base di sostanze funzionali: **Coenzima Q10**, **Astaxantina**, **L-Arginina**, **PABA** e **Carnitina** ed estratto di radice di **Salvia cinese**, con l'aggiunta di **Selenio** e **Zinco**, **Vitamina C** e **Vitamina E** e **Acido Folico**.

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	% VNR
L-carnitina	500 mg	---
Vitamina C	500 mg	625%
Salvia cinese e.s.	300 mg	---
L-Arginina	200 mg	---
Coenzima Q10	160 mg	---
Vitamina E	60 mg	500%
Zinco	15 mg	150%
PABA	100 mg	---
<i>Haematococcus pluvialis</i> e.s.	80 mg	---
- Astaxantina	8 mg	---
Acido folico	400 mcg	200%
Selenio	100 mcg	182%



14 bustine

14 bustine

Si consiglia l'assunzione di 1 bustina al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 200 ml (un bicchiere) d'acqua.

Una formula a doppia azione con ingredienti ad attività sinergica antifibrotica e antiossidante per il trattamento della fase iniziale della Malattia di la Peyronie

Coenzima Q10

Noto anche come ubiquinone, uno dei più potenti antiossidanti svolge ruoli importanti nella protezione dallo stress ossidativo e dai danni causati dai radicali liberi dell'ossigeno. In uno studio clinico randomizzato in pazienti con malattia di La Peyronie cronica precoce la terapia con Coenzima Q10 ha ridotto la placca e la curvatura del pene e migliorato la funzione erettile.

Astaxantina

Ha elevato potere antiossidante (ROS); in vitro è estremamente più potente dei più comuni antiossidanti naturali è in grado di moderare l'infiammazione attraverso un'inibizione della traslocazione del fattore NF-kB, questo fattore ha un ruolo riconosciuto in particolare nella malattia di La Peyronie.

L-Arginina

È un amminoacido precursore di ossido nitrico (NO). In uno studio la L-arginina ha dimostrato di inibire la fosfodiesterasi e la sintesi di collagene e indurre la apoptosi dei fibroblasti agendo così come una sostanza antifibrotica.

PABA

Si ritiene che il PABA (para-amminobenzoato di potassio) abbia un effetto antifibrotico diminuendo la concentrazione di serotonina, che contribuisce alla fibrogenesi. La linea guida della European Association of Urology per la curvatura del pene fornisce una raccomandazione di grado B per ridurre le dimensioni della placca e il dolore nella malattia di Peyronie.

L-Carnitina

L'acetil-L-carnitina è il precursore naturale dell'acetilcolina. Il suo utilizzo nella malattia di La Peyronie è legato alla capacità di prevenire la proliferazione dei fibroblasti e la collagenogenesi, riducendo i radicali liberi e la concentrazione intracellulare di calcio. Inoltre, protegge e ripristina le cellule con danni causati da infiammazione e ischemia.

Selenio

È un cofattore degli enzimi antiossidanti come l'enzima glutatione perossidasi (GSH-Px). Operando in sinergia con la vitamina E, la famiglia del glutatione perossidasi è deputata a combattere lo stress ossidativo dei radicali liberi.

Zinco e Vitamina C

Proteggono le cellule dallo stress ossidativo contrastando efficacemente i radicali liberi.

Vitamina E

Uno degli antiossidanti più presenti nell'organismo umano. Agisce come antiossidante naturale e protegge le cellule dai danni causati dai radicali liberi. Inoltre, è in grado di favorire la guarigione dei tessuti, prevenire la formazione di cicatrici e ridurre il rischio di coaguli nella circolazione sanguigna. Con la sua azione, blocca il processo ossidativo degli acidi grassi diminuendo la velocità di sviluppo di formazioni fibrose (le placche). I pazienti a cui è stata somministrata in quantità elevate hanno mostrato una riduzione nella curvatura del pene.

Acido Folico

Recenti studi suggeriscono che l'acido folico e il suo metabolita attivo 5-metil tetraidrofolato migliorano la biodisponibilità dell'ossido nitrico (NO), nonché lo scavenging diretto dei radicali superossidi.

Salvia cinese

Contiene sostanze attive come gli acidi salvianolici noti per avere attività antiossidante, antinfiammatoria, antitrombotica e cardioprotettiva.



Senza glutine

Avvertenze:

Non superare le dosi giornaliere consigliate. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Per l'apporto giornaliero di zinco, il prodotto è destinato agli adulti. Un consumo eccessivo può avere effetti lassativi.