

ReneClin® è un prodotto a base di estratti vegetali di **Cumino nero** (Nigella sativa L.), **Cedracca** (Ceterach officinarum DC.) e **Fillanto** (Phyllanthus niruri L.) associati alla **Vitamina B6** e ai **citrati di potassio e magnesio**.

Contenuti medi per dose giornaliera consigliata

Ingrediente	Per 1 bustina	Per 2 bustine
Cumino nero e.s.	500 mg	1000 mg
Cedracca e.s.	500 mg	1000 mg
Fillanto e.s.	250 mg	500 mg
Citrato di magnesio	909 mg	1.818 mg
- Magnesio	100 mg (VNR = 27%)	200 mg (VNR = 53%)
Citrato di potassio	833 mg	1.666 mg
- Potassio	300 mg (VNR = 15%)	600 mg (VNR = 30%)
Vitamina B6	5 mg (VNR = 357%)	10 mg (VNR = 714%)



Si consiglia l'assunzione di 1 o 2 bustine al giorno. Sciogliere il contenuto della bustina in 100 ml d'acqua.

20 bustine

20 bustine

ReneClin® è utile per **prevenire e/o ridurre la formazione di calcoli renali**.

Benefici di **ReneClin®**:

Espulsione dei calcoli di piccole dimensioni

Eliminazione dei frammenti residui **post-litotrissia**

Prevenzione della calcolosi nei **soggetti a rischio** (familiarità, dieta, stile di vita, recidive)

Cumino Nero
1000 mg

Il Cumino Nero (denominato Nigella sativa) e il suo principale componente, il timochinone, hanno dimostrato effetti positivi nel favorire la disgregazione e la riduzione della dimensione del calcolo renale di calcio ossalato, attraverso vari meccanismi di azione: antiossidanti, antinfiammatori ed effetti immunomodulatori.

Cedracca
1000 mg

È una fonte di antiossidanti in grado di ridurre la cristallizzazione dell'ossalato di calcio e la morfologia dei cristalli, grazie ad una azione inibitoria sulla crescita e l'aggregazione dell'ossalato di calcio monoidrato.

Fillanto
1000 mg

L'estratto secco ha dimostrato di essere utile nel ridurre le dimensioni medie dei calcoli, di essere in grado di eliminare i frammenti di calcolo dopo un intervento di litotrissia e di prevenire le recidive. L'assunzione causa un aumento della escrezione urinaria di magnesio e potassio, da cui la riduzione dei livelli di ossalato urinario e acido urico nei pazienti con iperossaluria e iperuricosuria.

Citrato di Magnesio e Potassio

Efficaci nel prevenire la formazione di calcoli tramite una attività chelante sul calcio, rendendo solubili i cristalli di ossalato e fosfato di calcio e una attività alcalinizzante permettendo la solubilizzazione dei cristalli urici.

Vitamina B6

Come coenzima della AGT (alanine-glyoxylate aminotransferasi) riduce la escrezione urinaria di ossalati e le recidive in pazienti soggetti a formazione di calcoli di ossalato di calcio.

Avvertenze:

Non superare la dose giornaliera consigliata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Sconsigliato a bambini, adolescenti, donne in gravidanza e allattamento.



Senza glutine